



Erste Hilfe bei Flusssäure-Verletzungen

Sofortiges Handeln ist vordringlich und kann lebensrettend sein.

Jeder Flusssäureverletzte ist, auch bei scheinbar geringfügigen Verätzungen, einem Arzt vorzustellen. Beschwerden können auch nach einem symptomfreien Intervall auftreten.

Haut

- verunreinigte Kleidung, auch Unterwäsche und Schuhe, sofort ausziehen, auf Selbstschutz achten. Kontaminierte Kleidung sofort entsorgen.
- Haut/Schleimhäute mind. 10 Minuten mit viel Wasser spülen
- Calciumgluconat-Gel auftragen und in die Haut einmassieren, nach Schmerzfreiheit noch weitere 15 Min. fortfahren
- Vorstellung beim Arzt

großflächige Verätzungen der Haut

- verunreinigte Kleidung, auch Unterwäsche und Schuhe, unter viel fließendem Wasser sofort ausziehen. Nach Möglichkeit unter Körperdusche. Helfer müssen an den Eigenschutz denken (säurefeste Handschuhe).
- Haut/Schleimhäute mit viel Wasser spülen
- nasse Calciumgluconat-Kompresse auflegen:
- 20-25ml Calciumgluconat-Lösung (10%ig, aus 10-ml-Ampullen) auf eine 10x10 cm große Kompresse geben
- Vorstellung beim Arzt

Augen

- unter Schutz des unverletzten Auges sofort bei geöffnetem Augenlid für mind. 10 Min. mit Wasser spülen
- lockeren Verband anlegen
- kein Calciumgluconat am Auge anwenden
- Vorstellung beim Augenarzt

Verschlucken

- Mund sofort kräftig ausspülen
- kein Erbrechen anregen
- sofort reichlich Wasser unter Zusatz von Calcium-Brausetabletten (eine Tablette auf ein Glas Wasser) in kleinen Schlucken trinken lassen
- Vorstellung beim Arzt

Einatmen

- Verletzten unter Selbstschutz aus dem Gefahrenbereich bringen
- sofort und dann alle 2 Stunden 4 Sprühstöße Junik Dosieraerosol inhalieren lassen
- Frischluft
- Vorstellung beim Arzt

Bei längerem Transport zum Arzt noch vor dem Abtransport Calcium-Brausetabletten (eine Tablette auf ein Glas Wasser) in kleinen Schlucken trinken lassen.

Bei Verletzten für Körperruhe sorgen und vor Wärmeverlust schützen.

Inhalt Notfallpäckchen

1 x Junik Dosieraerosol
1 x Calciumgluconat Gel
5 Ampullen zu je 10 ml Calciumgluconat 10%
1 x 10 Calcium-Brausetabletten, Sandoz fortissimum, 1000 mg
2 Kompressen, 10 x 10 cm
5 Einmalmundstücke für Junik Dosieraerosol
Merkblatt Flusssäure-Verletzungen

Die Artikel können über den Betriebsärztlichen Dienst (Tel. 838-56678) bezogen werden.